

Der im Arzneimittel enthaltene Bestandteil Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Die Salbe ist nach Anbruch der Tube innerhalb von 6 Monaten aufzubrauchen. Das Arzneimittel ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren! Nicht über 25 °C aufbewahren. Apothekepflichtig.

KELAN spag. Peka

Salbe zur Anwendung
auf der Haut

PEKANA®

Homöopathisches Arzneimittel

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Dosierung und Art der Anwendung:

1–2 mal täglich auf die betroffene Stelle auftragen, gegebenenfalls Salbenverband anfertigen. Bei der Anwendung als Salbenverband nur luftdurchlässige Materialien (z.B. Baumwolle) verwenden. Das Arzneimittel ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Der Kontakt mit Augen und Schleimhäuten sowie offenen Wunden ist zu vermeiden.

PEKANA® Naturheilmittel GmbH

Raiffeisenstr. 15, 88353 Kißlegg

Tel. 07563 91160

www.pekana.de

Zusammensetzung: 10 g enthalten: **Arzneilich wirksame Bestandteile:** Acidum silicicum Dil. D6 [D6 mit Ethanol 15 % (m/m)] (= Silicea) 0,30 g, Arnica montana spag. Peka Dil. D12 (HAB, V. 47b) 0,30 g, Graphites Dil. D6 [D6 mit Ethanol 15 % (m/m)] 0,20 g, Hypericum perforatum Dil. D6 [ab D4 mit Ethanol 15 % (m/m)] 0,30 g, Ledum palustre Dil. D12 [ab D4 mit Ethanol 15 % (m/m)] 0,30 g, Magnesium fluoratum Dil. D12 [ab D8 mit Ethanol 15 % (m/m)] 0,25 g, Manganum sulfuricum Dil. D12 [ab D4 mit Ethanol 15 % (m/m)] 0,30 g, Ruta graveolens spag. Peka Dil. D12 (HAB, V. 47a) 0,25 g. Salbengrundlage: Mittelkettige Triglyceride 2,60 g, Emulgierender Cetylstearylalkohol (Typ A) (Ph.Eur.) 0,85 g, Cetylpalmitat (Ph.Eur.) 0,75 g, Gereinigtes Wasser 3,60 g

35 g

PEKANA®