



advantage®

Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde Imidacloprid

**Name und Anschrift des Zulassungsinhabers
und, wenn unterschiedlich, des Herstellers, der
für die Chargenfreigabe verantwortlich ist**

Zulassungsinhaber:

Ⓢ Bayer Vital GmbH

Geschäftsbereich Tiergesundheit

D-51368 Leverkusen

Ⓐ Bayer Austria Ges.m.b.H.,

Herbststraße 6–10, A-1160 Wien

Hersteller:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

D-24106 Kiel

Bezeichnung des Tierarzneimittels

Advantage® 40 Lösung zum Auftropfen auf die Haut
für Hunde

Advantage® 100 Lösung zum Auftropfen auf die Haut
für Hunde

Advantage® 250 Lösung zum Auftropfen auf die Haut
für Hunde

Advantage® 400 Lösung zum Auftropfen auf die Haut
für Hunde

Imidacloprid

Wirkstoffe und sonstige Bestandteile

Wirkstoff:

10 % (100 mg/ml) Imidacloprid

Sonstige Bestandteile:

0,1 % (1 mg/ml) Butylhydroxytoluol (E 321)

Benzylalkohol

Eine Pipette enthält:

	Pipette	Imidacloprid	E 321
Advantage® 40 für Hunde (< 4 kg)	0,4 ml	40 mg	0,4 mg
Advantage® 100 für Hunde (≥ 4 < 10 kg)	1,0 ml	100 mg	1,0 mg
Advantage® 250 für Hunde (≥ 10 < 25 kg)	2,5 ml	250 mg	2,5 mg
Advantage® 400 für Hunde (≥ 25 kg)	4,0 ml	400 mg	4,0 mg

Anwendungsgebiete

Zur Vorbeugung und Behandlung des Flohbefalls und
zur Behandlung des Haarlingbefalls (*Trichodectes
canis*) bei Hunden.

Innerhalb von 24 Stunden nach der Anwendung von
Advantage® werden die auf dem Hund befindlichen
Flöhe abgetötet. Die einmalige Behandlung wirkt 4
Wochen lang gegen Flöhe.

Nach erfolgter Diagnose durch den Tierarzt kann das
Tierarzneimittel als Teil der Behandlungsstrategie bei
durch Flohstiche ausgelöster allergischer Hautent-
zündung (Flohallergiedermatitis, FAD) angewendet
werden.

Gegenanzeigen

Unter 8 Wochen alte Saugwelpen nicht be-
handeln.

Nicht bei Tieren anwenden mit bekannter Überemp-
findlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sons-
tigen Bestandteile.

Nebenwirkungen

Advantage® schmeckt bitter. Daher kann das Able-
cken der Applikationsstelle unmittelbar nach Auftra-
gung der Lösung beim Hund Speicheln verursachen.
Dies ist kein Zeichen einer Vergiftung und klingt nach
einigen Minuten ohne Behandlung wieder ab.

In sehr seltenen Fällen kann vorübergehender Haar-
ausfall, Juckreiz und/oder eine entzündliche Reakti-
on an der Applikationsstelle auftreten. Auch Anzei-
chen von Unruhe und Orientierungslosigkeit wurden
beobachtet. In Einzelfällen wurde bei Hunden über
vermehrten Speichelfluss und nervöse Symptome
wie Inkoordination, Zittern und Depression berichtet.
Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier/Ihren
Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage
aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder
Apotheker mit.

Zieltierart

Hund

**Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der
Anwendung**

Bei der Anwendung des Tierarzneimittels sind gege-
benenfalls die Hinweise des Tierarztes zu beachten.

Dosierung und Behandlungsschema



Hund (kg KGW)	Arzneimittel	Anzahl Pipetten	Imidacloprid (mg/kg KGW)
bis 4 kg	Advantage® 40 für Hunde	1 x 0,4 ml	mindestens 10
4 bis 10 kg	Advantage® 100 für Hunde	1 x 1,0 ml	mindestens 10
10 bis 25 kg	Advantage® 250 für Hunde	1 x 2,5 ml	mindestens 10
25 bis 40 kg	Advantage® 400 für Hunde	1 x 4,0 ml	mindestens 10
ab 40 kg	Advantage® 400 für Hunde	2 x 4,0 ml	mindestens 10

Das Schlüpfen von Flöhen in der Umgebung mit
nachfolgendem Neubefall des Hundes kann für
mindestens 6 Wochen nach Behandlungsbeginn
andauern. Um auch diese Flöhe zu erfassen, kön-
nen in Abhängigkeit von der Zahl an Flöhen in der
Umgebung des Tieres Wiederholungsbehandlungen
mit Advantage® notwendig sein. Zur Unterstützung
der Therapie wird empfohlen, auch das Lager der
Tiere und die direkte Umgebung mit einem Präparat
gegen adulte Flöhe und deren Entwicklungsstadien
zu behandeln.

Nasswerden des Hundes, z. B. nach Schwimmen
oder heftigem Regen, beeinträchtigt die Wirk-
samkeit von Advantage® nicht. Bei häufigem
Schwimmen oder nach dem Shampooieren kann
allerdings, in Abhängigkeit von der Zahl an Flöhen
in der Umgebung des Tieres, eine Wiederholung der
Behandlung notwendig werden. Diese jedoch nicht
häufiger als in wöchentlichen Abständen vornehmen.
Bei Haarlingsbefall wird eine weitere tierärztliche
Untersuchung 30 Tage nach Behandlung empfohlen,
da einzelne Tiere eine zweite Behandlung benötigen.


Art der Anwendung

Eine Pipette aus der Packung entnehmen. Für Hunde
von 40 kg Körpergewicht und mehr sind zwei Pipet-
ten zu verwenden. Die kindergesicherte Verschluss-
kappe abziehen, umgekehrt aufdrücken und unter
Drehen wieder abziehen. Die Pipette dabei senkrecht
nach oben halten.




Für Hunde unter 25 kg Körpergewicht:

Dem Hund, am besten in stehender Position, mit zwei Fingern das Fell zwischen den Schulterblättern so weit auseinanderheben, bis die Haut sichtbar wird. Dann Advantage® durch mehrmaliges Ausdrücken der Pipette direkt auf die Haut auftragen. Die Pipette dabei senkrecht nach unten halten.



Für Hunde ab 25 kg Körpergewicht:

Zur einfacheren Anwendung sollte der Hund stehen. Der Inhalt der Pipette(n) ist gleichmäßig verteilt über 3 bis 4 Stellen entlang der Rückenlinie von der Schulter bis zum Schwanzansatz aufzutragen. An jeder Auftragsstelle sollte das Fell so weit auseinandergehoben werden, bis die Haut sichtbar wird. Dann den Inhalt durch mehrmaliges Ausdrücken der Pipette portionsweise direkt auf die Haut auftragen.



Die Pipette dabei senkrecht nach unten halten.

Hinweise für die richtige Anwendung

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Um zu vermeiden, dass Wirkstofflösung an der Seite des Tieres herunterläuft, sollte die verabreichte Lösungsmenge pro Auftragsstelle nicht zu groß gewählt werden (siehe auch Abschnitt „Nebenwirkungen“).

Advantage® soll nur auf gesunde Hautpartien aufgetragen werden. Der Tierhalter soll darauf achten, dass sich frisch behandelte Tiere nicht gegenseitig an der Auftragsstelle lecken.

Wartezeit

Nicht zutreffend.

Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel außer Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln getrennt aufbewahren.

Das Arzneimittel nach dem auf der Pipette (Tube) und Faltschachtel angegebenen Ablaufdatum nicht mehr verwenden.

Der Blister ist in der Faltschachtel aufzubewahren.

Besondere Warnhinweise

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die

Anwendung bei Tieren:

Dieses Produkt ist zur äußerlichen Anwendung bestimmt und darf dem Tier nicht eingegeben werden. Vergiftungen nach unbeabsichtigter oraler Aufnahme bei Tieren sind unwahrscheinlich. In diesem Fall sollte eine symptomatische Therapie unter tierärztlicher Aufsicht erfolgen. Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt, aber die Verabreichung von Aktivkohle kann von Nutzen sein.

Augen- und Schleimhautkontakt beim Tier vermeiden. Der Tierhalter soll darauf achten, dass sich frisch behandelte Tiere nicht gegenseitig an der Auftragsstelle lecken.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender

Nach Gebrauch Hände sorgfältig waschen. Auftretende Arzneimittelreste auf der Haut des Anwenders mit Wasser und Seife entfernen.

Personen mit bekannter Hautüberempfindlichkeit können bei Hautkontakt besonders empfindlich auf das Produkt reagieren.

Augen- und Schleimhautkontakt vermeiden. Bei unbeabsichtigtem Augenkontakt sorgfältig mit Wasser ausspülen. Bei fortdauernder Haut- oder Augenreizung oder bei unbeabsichtigtem Verschlucken der Lösung ist ein Arzt zu konsultieren.

Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder Abfallmaterialien, sofern erforderlich

ⓓ

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

Ⓐ

Leere Packungen können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie abgelaufene oder nicht vollständig entleerte Packungen zu einer Problemstoff-Sammelstelle!

Genehmigungsdatum der Packungsbeilage

ⓓ Februar 2013

Ⓐ Jänner 2011

Weitere Angaben

Neuere Studien haben gezeigt, dass Imidacloprid neben seiner adultiziden Flohwirksamkeit auch eine Wirksamkeit gegen Flohlarven in der Umgebung des behandelten Tieres besitzt. Flohlarven in der Umgebung des Tieres werden abgetötet, wenn sie mit einem behandelten Tier in Kontakt kommen.

Das Lösungsmittel in Advantage® kann verschiedene Materialien, z. B. auch Kunststoffe, Leder, Stoffe oder lackierte Oberflächen, angreifen. Kontakt des Produktes oder der noch feuchten Auftragsstelle(n) mit solchen Materialien vermeiden.

In entsprechenden Untersuchungen mit dem Wirkstoff Imidacloprid an Ratten und Kaninchen ergaben sich keine Anzeichen primär embryotoxischer, teratogener oder reproduktionstoxischer Wirkungen. Studien an trächtigen und laktierenden Hündinnen zusammen mit ihren Welpen liegen erst in limitierter Zahl vor. Bisherige Beobachtungen lassen jedoch keine Unverträglichkeiten bei diesen Tieren erwarten.

Nach gleichzeitiger Gabe von Advantage® in der doppelten therapeutischen Dosierung mit folgenden in der Veterinärmedizin gebräuchlichen Arzneistoffen wurden keine Anzeichen klinischer Unverträglichkeit beobachtet: Fenthion, Lufenuron, Milbemycin, Febantel, Pyrantel und Praziquantel. Die Verträglichkeit von Advantage® unter Feldbedingungen mit einer Reihe von weiteren Routinetherapien, einschließlich Vakzinierung, konnte ebenfalls gezeigt werden.

Packungsgrößen:

Blisterverpackung mit 2 Pipetten

Blisterverpackung mit 3 Pipetten

Blisterverpackung mit 4 Pipetten

Blisterverpackung mit 6 Pipetten

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Ⓐ

Z.-Nr.: Advantage 40 mg für Hunde: 8-00322

Advantage 100 mg für Hunde: 8-00324

Advantage 250 mg für Hunde: 8-00326

Advantage 400 mg für Hunde: 8-00381

Falls weitere Informationen über das Arzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des Zulassungsinhabers in Verbindung.

Bayer