

WAS IST SUPRADYN® FORTE?

Nahrungsergänzungsmittel mit 13 Vitaminen, 9 Mineralstoffen und Coenzym Q10. Mit Süßungsmitteln. *Die Vitamine B₁, B₆, B₁₂, Niacin und Vitamin C tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel und zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.

1 BRAUSETABLETTE ENTHÄLT:

VITAMINE	% Referenzmenge ¹
Vitamin A	800 µg 100 %
Vitamin B ₁ (Thiamin)	3,5 mg 500 %
Vitamin B ₂ (Riboflavin)	4,2 mg 500 %
Vitamin B ₆	2,0 mg 143 %
Vitamin B ₁₂	3,0 µg 120 %
Vitamin C	180 mg 225 %
Vitamin D	5,0 µg 100 %
Vitamin E	12 mg 100 %
Vitamin K	25 µg 53 %
Paritochensäure	18 mg 300 %
Biotin	50 µg 100 %
Folsäure	200 µg 100 %
Niacin	48 mg 300 %

MINERALSTOFFE & SPURENELEMENTE

Calcium	120 mg 15 %
Magnesium	80 mg 21 %
Eisen	14 mg 100 %
Kupfer	1,0 mg 100 %
Jod	150 µg 100 %
Mangan	2,0 mg 100 %
Selen	50 µg 91 %
Molybdän	30 µg 100 %
Zink	10 mg 100 %

ANDERE

Coenzym Q10	4,5 mg k.A.
-------------	-------------

¹Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) nach Lebensmittelinformationsverordnung

VERZEHREMPFEHLUNG

Empfohlene tägliche Verzehrsmenge für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: Täglich 1 Brausetablette in einem Glas Wasser (ca. 250 ml) aufgelöst trinken. Die Einnahme erfolgt am besten mit oder nach einer Mahlzeit. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

30 Brausetabletten • 147 g

ZUTATEN

Säuerungsmittel Citronensäure, Säureregulator Natriumhydrogencarbonat, Füllstoff Sorbit, Calciumcarbonat, Magnesiumsulfat, Füllstoff Isomalt, L-Ascorbinsäure, Magnesiumcarbonat, Farbstoff Beta-Carotin, Orangenaroma, Säureregulator Natriumcarbonat, Eisenpyrophosphat, Coenzym Q10, Nicotinamid, Trennmittel Polyvinylpyrrolidon, DL- α -Tocopherolacetat, Retinylpalmitat, Zinkcitrat, Natriumchlorid, Passionsfruchtaroma, Süßungsmittel Aspartam[†], Mannit, Calcium-D-pantothenat, Süßungsmittel Acesulfam K, Farbstoff Beerenrot, Natriumselenat, Natrium-Riboflavin-5'-phosphat, Schaumverhüter Zuckerester von Speisefettsäuren, Mangansulfat, Natriummosphat, Thiaminhydrochlorid, Cyanocobalamin, Kaliumiodid, Kupfercitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol, Schaumverhüter (Polysorbit 80, Dimethylpolysiloxan, Siliciumdioxid), Phytomenadion, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin.
[†] Enthält eine Phenylalaninquelle.
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

WICHTIGE HINWEISE

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Trocknen und nicht über 25°C lagern.
Das Behältnis fest verschlossen halten.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Mindestens haltbar bis Ende: siehe Bodenlasche.
Supradyn® ist eine eingetragene Handelsmarke. Erhältlich in der Apotheke.
Vertrieb:
Bayer Austria Ges.m.b.H.,
Herbststraße 6-10, 1160 Wien



Unterstützt den
Energiestoffwechsel

Bei anhaltendem Stress

Bei Müdigkeit und
Erschöpfung

Bayer