

Gebrauchsinformation

Flor de piedra- logoplex®

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Homöopathisches Arzneimittel

Für Tiere

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe,
Ziegen, Hunde, Katzen

Zusammensetzung:

10g (=10 ml) Flüssige Verdünnung zur Injektion
enthalten: Wirkstoffe:

Lophophytum leandri (Flor de piedra) Dil. D3
1,0g, Chelidonium majus Dil. D4 0,5g, Lachesis
Dil. D8 0,5g, Strychnos nux-vomica Dil. D6
0,5g.

Sonstige Bestandteile:

Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

Darreichungsform und Inhalt:

Flüssige Verdünnung zur Injektion, 100 ml.

Pharmazeutischer Unternehmer:

FRANZ ZIEGLER GmbH, Ötzer Str. 10,
86672 Thierhaupten, Telefon: 08271-813111,
Telefax: 08271-813112

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel,
daher ohne Angabe einer therapeutischen
Indikation. Vor der Anwendung sollte eine tier-
ärztliche Untersuchung erfolgen.

Wechselwirkungen:

Wie bei allen Arzneimitteln können auch
bei homöopathischen Arzneimitteln Wechsel-
wirkungen mit anderen Arzneimitteln auftre-
ten. Wenn **Flor de piedra-logoplex®** gleichzeitig
mit einem anderen Arzneimittel angewendet
werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

Gegenanzeigen:

Keine bekannt.

Anwendung während Trächtigkeit und Laktation:

Zur Verträglichkeit von **Flor de piedra-logoplex®**
bei trächtigen und laktierenden Tieren liegen
keine Untersuchungsergebnisse vor. Wie alle
Arzneimittel sollten auch homöopathische
Arzneimittel während der Trächtigkeit und Lak-
tation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt
angewendet werden.

Nebenwirkungen:

Hinweis: Bei der Behandlung mit einem ho-
möopathischen Arzneimittel können sich
die vorhandenen Beschwerden vorübergehend
verschlimmern (Erstverschlimmerung). In die-
sem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen
und Ihren Tierarzt befragen. Falls Sie eine Ne-
benwirkung bei Ihrem Tier / Ihren Tieren fest-
stellen, die nicht in der Packungsbeilage aufge-
führt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder
Apotheker mit.

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung:

Vor Entnahme gut durchschütteln. Zur subkutanen Injektion. Entsprechend Tierart und Körpergewicht beträgt die Einzeldosis:

Pferd, Rind 10 ml

Kalb, Schwein 5 ml

Schaf, Ziege 3 ml

Hunde max. 0,2 ml/kg KGW (max. 3 ml pro Tier)

Katzen max. 0,2 ml/kg KGW (max. 1 ml pro Tier)

Je nach Schwere der Erkrankung und Krankheitsverlauf ist die angegebene Dosierung nach 24 Stunden zu wiederholen. Die Verabreichung des Medikamentes sollte nicht länger erfolgen als bis zur vollständigen Heilung des Tieres.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Eine Injektion dieses Arzneimittels sollte nur von Tierärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die die jeweilige Injektionstechnik sicher beherrschen. Unsachgemäß durchgeführte Injektionen können zu bleibenden Schäden bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen führen. Nach der Applikation ist das Tier über einen angemessenen Zeitraum zu beobachten, um bei Anzeichen einer anaphylaktischen Reaktion sofort therapeutische Maßnahmen ergreifen zu können. Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Wartezeit:

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege

Essbare Gewebe 0 Tage

Pferd, Rind, Schaf, Ziege

Milch 0 Tage

Besondere Lagerungshinweise:

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Nicht über 25°C lagern. Nicht konserviert. Nach Anbruch in der Flasche verbleibende Reste sind zu verwerfen. Konsequente Kühlung und sterile Entnahme sind wichtige Bestandteile der sachgerechten Handhabung. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Genehmigungsdatum der Packungsbeilage:

Juni 2009 – Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 133263.00.00

Hinweise für Anwender:

ZIEGLER Kombinationsarzneimittel bestehen aus natürlichen Vorkommen des pflanzlichen, tierischen und mineralischen Bereichs. In der vet.-hom. Literatur werden die Bestandteile dieses Arzneimittels u.a. beschrieben bei: Indigestionen ante und post partum, Pansenazidose; Labmagendilatation und Labmagenverlagerung, zur Vorbeuge und zur unterstützenden Therapie der Gebärpause; Hepatosen, Erhöhung der Leberwerte, Leberschutztherapie; Entgiftung und Ausscheidung von Stoffwechselschlacken, insbesondere in der Rekonvaleszenzphase nach intensiver pharmazeutischer Intervention.

Handelsform:

Originalpackung mit 5 Flaschen á 100 ml flüssiger Verdünnung zur Injektion.