

– ste imeli v preteklosti ledvične kamne,  
– jemljete zdravila za redčenje krvi.

**Sestavine:** D-manoza, prah rdeče pese, aroma maline, citronska kislina, trikalcijev fosfat, magnezijeve soli, sukraloza, inulin, ekstrakt vednozelenega gornika.

**Ne vsebuje alergenov in je primeren za vegetariance in vegane.**

**Vsebina vrečke:** 2 g D-manoze

**Vsebina:** 10 vrečk

**Shranjevanje:**

Shranjujte pri sobni temperaturi (5-25 °C) na suhem in temnem mestu v originalni embalaži. Hraniti nedosegljivo otrokom.

**Uporabnost:** femidoc® UROEXPRESS® DIREKT se ne sme uporabljati po izteku roka uporabe, navedenega na ovojnini.

**Medicinski pripomoček:** femidoc® UROEXPRESS® DIREKT je medicinski pripomoček razreda IIa skladno z evropsko direktivo 93/42 o medicinskih pripomočkih.

**Zadnja revizija navodila:** januar 2020.

**Distributer:** InnoPharma d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana, info@innopharma.biz

**Proizvedeno za:** doc phytolabor guterrat Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG, Eduard-Bodem-Gasse 6, 6020 Innsbruck, Avstrija  
doc@guterrat.net, www.dclabor.com

 PK Benelux BV, Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, NL 0481

# femidoc® UROEXPRESS® DIREKT

**(HR)** Za prevencijo učestalih infekcija mokračnih kanala / upale mjejhura uzrokovane bakterijom E. coli. Pomaže pri liječenju infekcije mokračnih kanala.

**Preporuka:** Prije uporabe femidoc® UROEXPRESS® DIREKT pažljivo pročitajte uputu, čak i ako ste već prije uzimali ovaj proizvod. Moguće je da su se informacije u međuvremenu, od vaše zadnje uporabe ovog proizvoda, a uslijed najnovijih rezultata istraživanja i nalaza, promjenile. Ovaj medicinski proizvod izdaje se bez recepta.

**Uporaba:** femidoc® UROEXPRESS® DIREKT upotrebljava se kao pomoć pri liječenju infekcije mokračnih kanala uzrokovane bakterijom E. coli te kao zaštita od ponovne upale mokračnih kanala (upale mjejhura).

**Simptomi upale mjejhura su:**  
– osjećaj болi i peckanje pri mokrenju  
– čest osjećaj potrebe za mokrenjem (pritisak)  
– učestalo mokrenje  
– bolovi u trbuhi.

Ako imate bilo koji od navedenih simptoma, обратite se svom ljekarniku ili liječniku opće prakse.

**Doziranje i uporaba za odrasle:**  
Kao prevencija uzima se jedna vrečica dnevno. Kao pomoć pri liječenju uzima se po jedna vrečica dva puta dnevno. Za oralnu uporabu: ne smije se prekoračiti preporučena dnevna doza.

femidoc® UROEXPRESS® DIREKT vrečice mogu se koristiti i bez vode.

**Duljina trajanja terapije:** Tijekom terapije femidoc® UROEXPRESS® DIREKT smije se uzimati najviše 30 dana. Nakon 4 dana pauze,

terapija se može ponoviti.

**Kako funkcioniра?**

Aktivna tvar je D-manoza. Prirodno je da se D-manoza pojavljuje u ljudskom metabolizmu. D-manoza se veže na bakterije E. coli i tako sprječava njihovo taloženje na stijenkama mokračnih kanala. Nakon toga bakterije se jednostavno vodom (mokrenjem) izlučuju iz tijela.

**Nuspojave:** femidoc® UROEXPRESS® DIREKT dobro se podnosi i ima vrlo rijetke nuspojave. Moguća nuspojava je proljev, što se ipak vrlo rijetko događa.

**Uporaba u trudnoći i/ili za vrijeme dojenja:** O uzimanju femidoc® UROEXPRESS® DIREKT u trudnoći odnosno za vrijeme dojenja nisu priloženi nikakvi podatci. Ako ste trudni ili dojite, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarkom prije uzimanja ovog proizvoda.

 **Pažnja:**

- Nemojte upotrebljavati ovaj proizvod ako ste alergični na neki od sastojaka.
- Kod predoziranja mogu se pojaviti npr. nadutost, bolovi u trbuhi i proljev.
- Proizvod držite dalje od dohvata djece.
- U slučaju nuspojava prekinite uzimanje femidoc® UROEXPRESS® DIREKT.

**Obrijeđe se svom liječniku ili ljekarniku:**

- ako primijetite tragove krvi u urinu
- kod neprekidnih simptoma koji se nakon 7 dana još eventualno pogoršaju
- ako već imate neko oboljenje ili uzimate neke druge lijekove
- kod simptoma upale mjejhura ili infekcije gornjeg mokračnog sustava, kao npr. temperature da 38° ili više, nekontrolirane groznice, mučnine (podražaja na povraćanje), povraćanje odnosno proljeva. Može se dogoditi da boljete od infekcije gornjeg mokračnog sustava, koja zahtijeva posebno liječenje.
- ako ste u prošlosti već imali bubrežni kamenac
- ako uzimate lijekove za razbijavanje krvi.

**Sastav:** D-manoza, prah crvene cikle, okus maline, limunska kiselina, trikalcij-fosfat, magnezijeve soli, sukraloza, inulin, ekstrakt lista medvjedke.

**Ne sadrži alergene i pogodan je za vegane.**

**Sadržaj vrećice:** 2 g D-manoze

**Sadržaj:** 10 vrećica

**Čuvanje:**

 Čuvajte na sobnoj temperaturi (5-25°C) na suhom i tamnom mjestu u originalnom pakiranju. Proizvod držite što dalje od dohvata djece.

**Datum isteka roka uporabe:** femidoc® UROEXPRESS® DIREKT ne smije se upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

**Medicinski proizvod:** femidoc® UROEXPRESS® DIREKT medicinski je proizvod klase IIa prema Direktivi 93/42/EUropske ekonomiske zajednice o medicinskim proizvodima.

**Datum revizije upute:** siječanj 2020.

**Distributer:** InnoPharma d.o.o., Podružnica Zagreb za promidžbu, Srebrnjak 61, Zagreb, info@innopharma.biz

**Proizveden za:** doc phytolabor guterrat Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG, Eduard-Bodem-Gasse 6, 6020 Innsbruck, Avstrija  
doc@guterrat.net, www.dclabor.com

 PK Benelux BV, Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, NL 0481



# femidoc® UROEXPRESS® DIREKT

**HARNWEGSINFektIONEN / ZYSTITIS**  
**INFEKCIJA MOKRAĆNOG MJEHURA / CISTITIS**  
**VNETJE SEČNEGA MEHURJA / CISTITIS**



# femidoc®

## UROEXPRESS® DIREKT

**DE** Dient zur Prävention von durch *E. coli* verursachten wiederholt auftretenden Harnwegsinfektionen / Blasenentzündung. Unterstützt die Behandlung von Harnwegsinfektionen.

**Empfehlung:** Vor der Einnahme von femidoc® UROEXPRESS® DIREKT die Gebrauchsanweisung aufmerksam durchlesen, auch wenn Sie dieses Medizinprodukt vorher schon einmal eingenommen haben. Es kann sein, dass sich die Informationen in der Zwischenzeit, seit Sie Ihre letzte Packung geöffnet haben, gemäß den neueren Forschungsergebnissen und Befunden geändert haben. Dieses Medizinprodukt ist nicht verschreibungspflichtig.

**Anwendung:** femidoc® UROEXPRESS® DIREKT dient zur Unterstützung der Behandlung von durch *E. coli* verursachten Harnwegsinfektionen in der Blase sowie zum Schutz vor wiederholt auftretenden Harnwegsinfektionen (Blasenentzündung).

### Die Symptome einer Blasenentzündung sind:

- Ein brennendes oder schmerhaftes Gefühl bei der Harnentleerung

- Harndrang

- Häufige Blasenentleerung

- Bauchschmerzen.

Wenden Sie sich bitte an Ihren Apotheker oder Hausarzt, wenn Sie an den Symptomen einer Blasenentzündung leiden.

### Dosierung und Verwendung, Erwachsene

#### und Kinder ab 18 Jahren:

Zur Prävention wird einmal täglich je 1 Beutel eingenommen. Zur Unterstützung der Behandlung nimmt man zweimal täglich je 1 Beutel. Zur oralen Verwendung. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.

femidoc® UROEXPRESS® DIREKT Beuteln können ohne Wasser eingenommen werden.

#### Anwendungsdauer:

femidoc® UROEXPRESS® DIREKT darf innerhalb einer Behandlungsperiode höchstens 30 Tage lang eingenommen werden. Nach 4 Tagen Pause kann die Behandlung wieder aufgenommen werden.

#### Wie funktioniert es?

Der Wirkstoff ist D-Mannose. D-Mannose kommt von Natur aus im menschlichen Stoffwechsel vor. D-Mannose haftet an *E. coli* Bakterien an und verhindert somit, dass sich die Bakterien an den Wänden der Harnwege absetzen. Daraufhin werden die Bakterien ganz einfach beim Wasser lassen aus dem Körper ausgespült.

#### Nebenwirkungen:

femidoc® UROEXPRESS® DIREKT ist gut verträglich und hat wenig Nebenwirkungen. Eine mögliche Nebenwirkung ist Durchfall; dies kommt jedoch nur selten vor.

#### Verwendung während der Schwangerschaft und / oder Stillzeit:

Über die Einnahme von femidoc® UROEXPRESS® DIREKT während der Schwangerschaft beziehungsweise Stillzeit liegen keine Daten vor. Bevor Sie dieses Produkt während der Schwangerschaft oder Stillzeit einnehmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.



#### Achtung:

- Das Produkt nicht verwenden, wenn Sie gegenüber einem der folgenden Inhaltsstoffe allergisch sind.

- Bei Überdosierung können Beschwerden auftreten, beispielsweise Blähbauch, Bauchschmerzen und Durchfall.

- Darf nicht in die Hände von kleinen Kindern gelangen.

- Bei Unverträglichkeitsreaktionen mit der Einnahme von femidoc® UROEXPRESS® DIREKT aufhören.

#### Wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker, wenn:

- Sie Blutspuren im Urin feststellen.

- Bei anhaltenden Symptomen, die sich nach 7 Tagen eventuell noch verschärfen.

- Sie bereits eine Erkrankung haben oder andere Medikamente einnehmen.

- Bei Symptomen einer Blasenentzündung oder einer Infektion der oberen Harnwege, wie beispielsweise 38 °C oder höherem Fieber, unkontrollierbarem Fieberschauern /Schüttelfrost, Übelkeit (Brechreiz), Erbrechen beziehungsweise Durchfall.

Letzte Überarbeitung dieser Gebrauchsanweisung im Januar 2020.

**Hergestellt für:** doc phytolabor **guterrat** Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG, Eduard-Bodem-Gasse 6, A-6020 Innsbruck, doc@guterrat.net, www.doclabor.com

**Beutelinhalt:** 2 g D-Mannose.

**Inhalt:** 10 Beutel.

#### Aufbewahrung:

Bei Raumtemperatur (5 - 25 °C) an einem trockenen, dunklen Ort in der Originalverpackung aufbewahren. Das Produkt darf nicht in die Hände von kleinen Kindern gelangen.

**Verfalldatum:** Verwenden Sie femidoc® UROEXPRESS® DIREKT keinesfalls nach dem auf der Verpackung angegebenen Datum.

**Medizinprodukt:** femidoc® UROEXPRESS® DIREKT ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß der Europäischen Richtlinie 93/42/ EWG über Medizinprodukte.

Letzte Überarbeitung dieser Gebrauchsanweisung im Januar 2020.

**Hergestellt für:** doc phytolabor **guterrat** Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG, Eduard-Bodem-Gasse 6, A-6020 Innsbruck, doc@guterrat.net, www.doclabor.com

 PK Benelux BV, Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, NL 0481



# femidoc®

## UROEXPRESS® DIREKT

**SI** Preprečeju ponavljajoče se okužbe sečil/mehurja, ki jih povzroča bakterija *E. coli*. Pomaga pri zdravljenju okužb sečil.

**Priporočilo:** Pred uporabo izdelka femidoc® UROEXPRESS® DIREKT natančno preberite navodila, tudi če ste v preteklosti že uporabljali izdelek. Morda so se od vaše zadnje uporabe informacije zaradi izsledkov najnovejših raziskav spremeniile. Ta medicinski pripomoček se izdaja brez recepta.

**Uporaba:** femidoc® UROEXPRESS® DIREKT se uporablja kot pomoč pri zdravljenju okužb sečil/mehurja, ki jih povzroča bakterija *E. coli*, pa tudi kot zaščita pred ponovnim vnetjem sečil (vnetjem mehurja).

Simptomi vnetja mehurja so:

- bolečina in pekoč občutek med uriniranjem,
- pogost občutek siljenja na vodo (pritisk),
- pogosto uriniranje,
- bolečine v trebuhi.

Če imate navedene simptome, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

#### Odmerjanje in uporaba za odrasle:

Za preprečevanje – eno vrečko na dan. Za pomoč pri zdravljenju – dvakrat na dan po eno vrečko. Samo za oralno uporabo. Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.

Vrečke femidoc® UROEXPRESS® DIREKT lahko zaužijete brez vode.

**Trajanje terapije:** femidoc® UROEXPRESS® DIREKT lahko jemljete največ 30 dni. Nato prekinite jemanje. Po 4 dneh lahko nadaljujete

s terapijo.

#### Kako deluje

Aktivna sestavina je D-manoza. Ta je naravno prisotna v človeškem metabolizmu. D-manoza se veže na bakterije *E. coli* in preprečuje njihovo pritrđitev na stene urinarnega trakta. Nato se bakterije enostavno, z vodo (uriniranjem), izperejo iz telesa.

**Neželeni učinki:** femidoc® UROEXPRESS® DIREKT se dobro prenaša in ima zelo redke neželene učinke. Eden možnih neželenih učinkov je driska, vendar je zelo redka.

#### Uporaba v nosečnosti in med dojenjem:

O jemanju femidoc® UROEXPRESS® DIREKT v nosečnosti oziroma med dojenjem ni podatkov. Če ste noseči ali dojite, se o uporabi posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

#### Opozorilo:

- Ne uporabljajte, če ste alergični na katero od sestavin.
- Ob prekoračitvi odmerka se lahko pojavijo npr. napihnenost, bolečine in driska.
- Shranjujte nedosegljivo otrokom.
- Ob neželenih učinkih prekinite jemanje izdelka femidoc® UROEXPRESS® DIREKT.

#### Posvetujte se s svojim zdravnikom ali farmacevtom, če:

- opazite sledi krvi v urinu,
- imate neprekrajne simptome, ki se po 7 dneh še poslabšajo,
- že imate neko bolezen ali jemljete druga zdravila,
- imate simptome okužbe mehurja ali okužbo zgornjih sečil, kot npr. temperatura 38 °C, neobvladljive mrzelice, slabost (siljenje na bruhanje), bruhanje oziroma driska; lahko se zgoditi, da imate vnetje zgornjih sečil, kar zahteva posebno zdravljenje,