

Lippenherpes



• Anwendungshinweise:

- Bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren muss die Anwendung durch einen Erwachsenen erfolgen.
- Tragen Sie eine dünne Schicht des Produkts mit dem Einweg-Applikator direkt auf den Lippenherpes auf. Nach der Anwendung können Sie ein vorübergehendes Kribbeln oder Brennen verspüren.
- Etwa 1–2 Minuten trocknen lassen, damit sich der Film bilden kann. Die Trocknungszeit hängt von der aufgetragenen Menge ab.
- Auf Ihrem Lippenherpes bildet sich ein transparenter Film.
- Wiederholen Sie die Anwendung 2- bis maximal 4-mal pro Tag, wenn der Film den Lippenherpes nicht mehr bedeckt.
- Die Behandlung ist bis zur vollständigen Heilung fortzusetzen.
- Dieses Filmogel kann ab den ersten Anzeichen (Kribbeln, Jucken, Brennen) angewendet werden, um den Ausbruch von Lippenherpes zu begrenzen.

URGO Lippenherpes wurde für eine praktische, sichere und hygienische Anwendung entwickelt.

• Gegenanzeigen:

Nicht anwenden in folgenden Fällen:

- Bei Herpesbläschen mit einem Durchmesser von mehr als 1 cm ist ein Arzt aufzusuchen.
- Bei bakterieller Infektion und/oder Risiko einer bakteriellen Infektion (Impetigo)
- Bei Immunsuppression (aufgrund einer chronischen Erkrankung und/oder aufgrund einer Chemotherapie)
- Bei atopischem Ekzem (Neurodermitis) während eines Herpesausbruchs.

Nicht verwenden, wenn Sie allergisch auf einen der Inhaltsstoffe reagieren.

Aufgrund fehlender Daten wird die Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

• Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

- Anwendung nur auf der Haut.
- Kann beim Auftragen kurz brennen.
- Nicht bei Kindern unter 6 Jahren anwenden.
- Nicht in der Nähe der Augen auftragen.
- Augenkontakt vermeiden. Reizt die Augen.
- Flasche nach Gebrauch fest verschließen.
- Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 6 Monaten verwendet werden.
- Applikator nicht wiederverwenden (Einmalgebrauch).
- Nicht einnehmen bzw. verschlucken.
- Während der Anwendung, vor dem vollständigen Trocknen des Produkts oder in der Nähe der geöffneten Flasche nicht rauchen.
- Im flüssigen Zustand entzündbar.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Die Reste des Films müssen vor der nächsten Anwendung nicht entfernt werden.
- Bei Bedarf kann der Film durch erneutes Auftragen und sofortiges Abwischen mit einer Mullkomresse entfernt werden.
- Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt oder Apotheker oder:
 - wenn Lippenherpes bei Ihnen häufiger als 6 Mal pro Jahr auftritt,
 - wenn Sie nach 7 Tagen keine Besserung feststellen.

• Anwendungsgebiete:

URGO Lippenherpes wird zum Schutz und zur Behandlung von Bläschen und Beschwerden bei Lippenherpes – auch Fieberbläschen genannt – angewendet. Die Anwendung sollte bereits bei den ersten Anzeichen (Kribbeln, Juckreiz, Brennen) beginnen und bis zum vollständigen Abklingen der Herpesbläschen fortgesetzt werden.

URGO Lippenherpes ist ein Filmogel®: Es bildet einen diskreten und isolierenden Film mit therapeutischer Wirkung, der in allen Stadien des Lippenherpes wirksam ist und:

- Kribbeln, Juckreiz und Brennen lindert.
- Den Ausbruch von Lippenherpes begrenzt.
- Die Bildung von Bläschen und Krusten begrenzt.
- Den Heilungsprozess fördert.
- Ansteckung verhindert.

• Aufbewahrung:

- Nicht nach Ablauf des auf der Verpackung aufgedruckten Verfalldatums anwenden.
- Von offener Flamme und Zündquellen fernhalten, nicht über 40°C lagern

• Inhaltsstoffe:

Zellulosederivat, Mineralsäure, Carbonsäure, Pflanzenöl, Alkohol und Wasser.

• Hygienetipps bei Lippenherpes:

Durch die Bildung eines flexiblen und diskreten Films isoliert das Filmogel® URGO Lippenherpes die Bläschen.

Zur Vermeidung von Selbstansteckung oder Ansteckung anderer sollten folgende Hygieneregeln eingehalten werden:

- Küssen Sie keine anderen Personen, besonders keine Kleinkinder.
- Nach Kontakt mit der betroffenen Stelle gründlich die Hände waschen.
- Nicht an Augen oder Augenlidern reiben.
- Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, befeuchten Sie diese nicht mit Speichel.
- Die betroffene Stelle nicht berühren oder aufkratzen.

Medizinprodukt.

Datum der CE-Kennzeichnung: 2017

Letzte Überarbeitung der Packungsbeilage: 10–2023

Bei Fragen, wenden Sie sich bitte an: info@protina.de

Vertrieb in Deutschland:

Protina Pharmazeutische GmbH

Adalperostraße 37 - 85737 Ismaning

info@protina.de

